

# Ossicodone a rilascio modificato nella terapia antalgica delle patologie osteodegenerative

A. Ranno<sup>1</sup>, S. Sangiorgi<sup>1</sup>, V. Torre<sup>2</sup>, V. Panebianco<sup>1</sup>, G. Profeta<sup>3</sup>, S. Percolla<sup>4</sup>, B.V. Costanzo<sup>1</sup>.

Samo onlus,<sup>1</sup> - Resp. UVP Catania, ASL3<sup>2</sup> - M.M.G. SIMG<sup>3</sup> - Cenestesi onlus, Catania.<sup>4</sup>

## INTRODUZIONE

In Italia i farmaci antiinfiammatori non steroidei (FANS) sono i più utilizzati (90%) nel trattamento del dolore cronico benigno, con conseguente aumento delle patologie gastrolesive e del consumo di farmaci inibitori di pompa protonica in pazienti >65 anni.

## OBIETTIVO


Testare l'efficacia dell'ossicodone RM a dosaggio di 5 mg (*bis in die*) nel trattamento del dolore cronico da patologia osteodegenerativa, in collaborazione con i medici di famiglia che si affidano all'esperienza dei medici SAMO per affrontare, in caso di patologie oncologiche e non, le problematiche concernenti la terapia del dolore.

## METODI


22 pazienti (12M e 10F) in terapia con Fans da almeno tre mesi o naive, sono stati intervistati mediante appositi questionari. Il sintomo dolore è stato valutato tramite Visual Analogic Scale [ VAS (0-10) ], prima e dopo la somministrazione di ossicodone 5 mg RM.

## RISULTATI

Dei 22 pazienti reclutati, 15 hanno concluso lo studio, 7 (2M e 5F) hanno sospeso dopo 24 ore per la comparsa di eventi avversi (4 dissociazione, 1 nausea severa et al.), di questi 5 Pazienti non avevano mai effettuato terapia antalgica e 2 avevano praticato terapia cronica con FANS. Il tempo medio per ottenere una riduzione significativa del dolore da VAS 6-7 a VAS 2-3 è stato di 72 ore. L'effetto antalgico si è poi mantenuto costante nel tempo (rilevazione a 7 e 14 giorni). L'effetto collaterale più riferito, che però non ha portato ad interrompere lo studio, è stata la nausea.



Riduzione della VAS dopo ossicodone 5 mg *bis in die*



Tempo medio per una riduzione significativa della VAS (da 6-7 a 2-3)

## CONCLUSIONI

In conclusione l'ossicodone 5 mg RM in doppia somministrazione giornaliera permette un buon controllo del dolore in pazienti affetti da patologia degenerativa osteoarticolare precedentemente trattati con FANS. Costituisce pertanto una valida alternativa alla terapia con antiinfiammatori per uso antalgico.